

	生ワクチン (乾燥弱毒生水痘ワクチン)	不活化ワクチン (乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン)
販売名	ピケン	シングリックス
ワクチンの特徴	皮下注射	筋肉注射
有効性	<p>発症予防効果が中程度: 発症予防効果は50～59歳で69.8%、60歳以上の方で51.3%</p> <p>帯状疱疹後神経痛予防効果が中程度: 60歳以上での帯状疱疹後神経痛予防効果は66.5%</p> <p>長期予防効果が低い: ワクチン接種後の予防効果は、1年目では67.5%、2年目には47.2%、8年目には31.8%まで低下</p>	<p><b>発症予防効果が非常に高い</b>: 発症予防効果は50歳以上で97%、70歳以上で91%</p> <p><b>帯状疱疹後神経痛の予防効果が非常に高い</b>: 70歳以上での神経痛予防効果は85.5%</p> <p><b>発症を長期に予防する</b>: 50歳以上の成人試験で、10年以上は80%を超える有効性</p>
副反応	<p><b>副反応の発現率が非常に低い</b> 基礎疾患等により打てない場合がある</p>	<p>副反応の発現率が高い: 注射部位の腫れや赤み、発熱や頭痛などの発現頻度が多い</p>
接種を受けられない方	<p>過去にこのワクチンの成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある方</p> <p>先天性及び後天性免疫不全状態の方</p> <p>副腎皮質ステロイド剤や免疫抑制剤等の治療を受けており、免疫抑制状態の方</p> <p>明らかな発熱がある方(37.5度以上)や急性疾患にかかっている方</p>	<p>過去にこのワクチンの成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある方</p> <p>明らかな発熱がある方(37.5度以上)や急性疾患にかかっている方</p>