

感染症についてのお知らせ

墨田区保健所 保健予防課 感染症係 区役所3階
電話 03-5608-6191(直通) FAX 03-5608-6507

令和6年
8月号



東京都内の感染症流行情報

第30週（7月22日～7月28日）の定点当たり報告数

・新型コロナウイルス感染症

東京都 9.13人/週 前週（8.50人/週）
墨田区 13.13人/週 前週（14.38人/週）

増加傾向を
維持

・感染性胃腸炎

東京都 2.91人/週 前週（2.94人/週）
墨田区 2.00人/週 前週（1.20人/週）

落ち着いて
きた印象

・手足口病

東京都 13.72人/週 前週（13.94人/週）
墨田区 13.60人/週 前週（14.60人/週）

警報レベル
継続

令和6年8月2日時点 墨田区内保育園・学校の感染状況
新型コロナウイルス 感染性胃腸炎 手足口病



色が濃いほど患者が多いことを示しています。

地図引用元：学校等欠席者・感染症情報システム

▼子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種無料は今年度までです！

子宮頸がんワクチン（HPVワクチン）の積極的な勧奨は平成25年6月～令和4年3月31日までの間、控えられていました。これは、ワクチン接種後に持続的な痛みが出た事例などが報告され、ワクチンの安全性を確認する必要があったためです。

しかしながら、その後ワクチンの安全性が確認され、ワクチンの有効性が、副反応のリスクを明らかに上回ることが認められたため、現在は子宮頸がんワクチンの接種を国としてお勧めしています。

そのため、積極的な勧奨を控えていた期間に子宮頸がんワクチンの接種機会を逃してしまった可能性のある

この期間に接種の機会を逃した
平成9年4月2日から平成19年4月1日生まれ
の女性は無料で子宮頸がんワクチンを
接種できます！



平成9年4月2日～平成19年4月1日 に生まれた女性

に対して、「キャッチアップ接種」として、
無料での子宮頸がんワクチン接種を行っています。
キャッチアップ接種を受けることができるのは

令和7年3月31日まで

となっております。

ご対象の方には予診票をお送りしておりますので、
予診票をお持ちの上、接種医療機関を受診してください。
キャッチアップ接種の詳細は墨田区HPをご覧ください。

この機会を逃して
自費で接種すると
7～9万円程度
かかります！



詳しい情報は
こちらからご覧ください。



墨田区HP
「今だからこそ予防できるガン
があります（HPV(子宮頸がん予
防)ワクチンの予防接種)」

●なぜ子宮頸がんワクチン（HPVワクチン）が必要なの？

HPV(ヒトパピローマウイルス)は多くの人が感染し、その一部が子宮頸がんなどの病気を引き起こします。子宮頸がんは近年20代から30代で増加しているのが特徴で、妊娠や出産に影響する可能性があります。ワクチンを接種することでHPVに感染する可能性を下げることができます。（ワクチン接種に加えて定期的な子宮頸がん検診も大切です。）

海外旅行の際は麻しん（はしか）の感染に気を付けましょう

ヨーロッパで麻しんの報告数が増えています

2023年末から、ヨーロッパ地域で麻しんの流行が生じています。該当地域に旅行する際には、麻しんの予防接種歴をご確認ください。

麻しんとは？

麻しんは麻しんウイルスによる全身性の感染症です。感染経路は飛沫感染、接触感染のほかに、空気感染があり、その感染力は非常に強いとされています。免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症すると言われています。

● 症状

感染すると約10日後（最大21日後）に38～39℃の発熱や咳、鼻水などの風邪のような症状が2～3日続きます。（カタル期）その後、いったん解熱した後に、再び40℃近い発熱と全身の発疹が出現します。（発疹期）通常3～4日で解熱し、発疹は色素沈着を遺して消退します。（回復期）

● 合併症

麻しんの2大死因は肺炎と脳炎といわれています。肺炎の合併は約6%、脳炎の合併は1000例に0.5～1例の割合で発生します。その他にも中耳炎や心筋炎、クループ症候群（上気道の狭窄）が合併症にあります。また、重篤な合併症の一つとして亜急性硬化性全脳炎（SSPE）があります。SSPEは麻しんウイルスによりゆっくりと進行する脳炎で、麻しんにかかった後、5～10年の潜伏期間を経て発症します。性格の変化や知能の低下、けいれんなどといった精神・神経症状が生じ、予後は不良です。

● 予防するには

- ・麻しん・風しんワクチンの定期接種は、2回接種です。
- ・ご自身の麻しんの罹患歴（過去にかかったか）、麻しんワクチンの予防接種歴（2回接種されているか）を確認しましょう。
- ・ワクチンを2回接種していても麻しんに感染してしまうこともありますが、症状が軽く、他者への感染力も低下します。

麻しんにかかったことがある人
予防接種を2回受けた人



基本的にワクチン接種は不要です
（ワクチンを2回接種していても
感染の可能性はあります）

麻しんにかかったことがなく、
予防接種歴不明または1回以下の人




ワクチン接種について
医療機関に相談しましょう

- ・妊娠している方はワクチン接種ができないので注意が必要です。

● ヨーロッパ地域での流行状況

2023/6～2024/5



● ヨーロッパ地域での患者報告数

2023/6～2024/5

国	報告数（人）
カザフスタン	40615
アゼルバイジャン	30217
ロシア	21261
キルギス	17182
ルーマニア	8888
トルコ	3981
ウズベキスタン	1973
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ	1154
イギリス	1087
アルメニア	781

「Measles cases—WHO European Region, June 2023–May 2024」より作成



海外渡航の際には、渡航前に
以下のページをご確認ください！



厚生労働省 検疫所
FORTH HP
「海外へ渡航される皆
様へ！！」

このお知らせは、東京都感染症情報センター（<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/>）の情報及び東京都健康安全研究センターが集計を行った「東京都感染症発生動向調査週報」（<https://survey.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/epidinfo/epimenu.do>）、「東京都感染症マニュアル2018」、厚生労働省HP「麻疹について」（https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html）、「予防接種に関するQ&A集 2023」の情報をもとに作成しています。